

Connecting**Chemistry**



NEUBASIL SOFT M Liquid

Maize ensiler formulation

POPIS PRODUKTU


NEUBASIL Soft M liquid je konzervant charakteristický predĺženou dobou účinku. Ochráňuje siláž pred stratou výživných látok a pred kontamináciou mykotoxínmi.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- ✓ Kukuričná siláž (celá plodina)
- ✓ Drvené zrná kukurice a ostatných obilnín
- ✓ Celé zrná obilnín
- ✓ Pivovarnícke mláto
- ✓ CCM

EFEKTIVITA A DÁVKOVANIE

Dôsledky strát počas skladovania



Účinky plesní na nutričné hodnoty

	ME Kcal/kg	PROTEIN %	FAT %	FIBRE %	STARCH %	SUGARS %
Matze	3410	8,9	4,0	3,1	57,6	4,3
Matze Infected with fungi	3252	8,3	1,5	3,4	58,1	4,6
	-10%	-9%	-63%			

Dávkovanie

ENSEILED MATERIAL	DOSAGE	% OF DRY MATTER	DOSAGE	% OF DRY MATTER
Matze silage	1,0-2,5 kg/t	up to 35%	2,5-3,5 kg/t	over 35%
CCM, grain	2,5-3,5 kg/t	up to 70%	2,5-3,5 kg/t	over 70%
Top layer of silage	1,0 kg/m ²		1,0 kg/m ²	
Walls of the silo	2,0 kg / 10 m ² (in 10 litres of water)		2,0 kg / 10 m ² (in 10 litres of water)	

VÝHODY POUŽÍVANIA

- Zabraňuje tvorbe mykotoxínov
- Zachováva plnú výživovú hodnotu siláže
- Podporuje silážovacie procesy (rýchle zníženie pH)
- Znižuje straty (ohriatie siláže po otvorení sila, sekundárna fermentácia)
- V dôsledku prítomnosti lignosulfonátu je prípravok:
 - Menej korozívny (o 70-80% v porovnaní s kys. mravčou)
 - Nižšie náklady na údržbu a opravu strojov a zariadení, rezačiek, aplikátorov
 - Menej prchavý (menej kyseliny vo vzduchu, viac v krmive a siláži), lepšie pracovné prostredie pre obsluhujúci personál (menej dráždivého a nepríjemného zápachu)
 - Nižšie pH (okyslenie), pridaním ligosulfonátu predlžuje dobu účinku kyselín
 - Klasifikovaný ako dráždivý, nie však korozívny, ako väčšina silážnych konzervantov (bezpečnejšia aplikácia a manipulácia, ekologický prípravok)
 - Lignosulfonát je zložená molekula, ktorá mechanicky viaže časti kyselín a uvoľňuje ich kedykoľvek je to potrebné

ZLOŽENIE

Kyselina propiónová, kyselina octová, lignosulfonát sodný

SKLADOVANIE, POUŽITELNOSŤ, BALENIE

Skladovať v suchých, chladných a tmavých skladoch.

Produkt treba spotrebovať do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Dostupný v 1 000 L IBC, 200 L sudoch, 30L kanistroch a voľne ložený.